HÖGRISKGRUPPER FÖR SMITTSPRIDNING

Följande grupper av hästar utgör en högre risk för att sprida smitta:

- ✓ Hästar som anländer från stora anläggningar (med stort flöde av hästar) har varit utsatta för en stor kontaktyta mot andra hästar.
- ✓ Avelsston (med eller utan föl vid sidan) som har varit iväg på semin-station eller naturlig betäckning, har utsatts för en stor kontaktyta mot andra hästar.
- ✓ Hästar som har vistats på djursjukhus och som har haft en stor kontaktyta mot andra hästar.
- ✓ Unghästar (under fyra år) innebär en högre smittrisk på grund av att deras immunförsvar inte är fullt utvecklat. Vid sjukdom kan de utsöndra mer smittämnen än äldre hästar.
- ✓ Hästar som transporterats långt och/-eller i många timmar och/-eller transporterats med kommersiella transporter som har haft en stor kontaktyta mot andra hästar.
- ✓ Hästar som är ovaccinerade.
- ✓ Hästar som kommer från en anläggning där det är känt att symptom på smitta förekommit de senaste tre veckorna.

LÄS MER: hastsverige.se | sva.se | jordbruksverket.se

#SMITTFRITTSTALL

VI ARBETAR TILLSAMMANS FÖR ETT BÄTTRE SMITTSKYDD – HNS DJURVÄLFÄRDSKOMMITTÉ
(Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Hästnäringens Riksanläggningar, LRF Häst, SVA, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Swedish Warmblood Association och Western Riders Association of Sweden).

HNS
Hästnäringens Nationella Stiftelse